

DetECCIÓN TEMPRANA = MEJORES RESULTADOS

Las pruebas rutinarias de cáncer ayudan a detectarlo de manera temprana, aunque usted no presente señales ni síntomas y así aumenta las probabilidades de éxito en el tratamiento.

Hable con su proveedor de atención médica acerca de cualquier historia de cáncer personal o familiar, para determinar si debe hacerse pruebas de detección a una edad más temprana o con mayor frecuencia. Tener uno o más miembros de la familia con antecedentes de ciertos cánceres como cáncer de seno, colorrectal o próstata, pueden aumentar su riesgo de desarrollar cáncer.

Encuentre su edad y las pruebas de detección correspondientes		20s	30s	40s	50s	60s	70s	80s
Prueba de detección de cáncer de seno <i>Si es transgénero, hable con su proveedor de atención médica.</i>	Examen clínico de seno	●	●	●	●	●	●	●
	Mamografía			●	●	●	●	●
Prueba de detección de cáncer de cuello uterino <i>De 21-65 años. Después de los 65 años, hable con su proveedor de atención médica.</i>		●	●	●	●	●	Hable con su proveedor de atención médica	Hable con su proveedor de atención médica
Prueba de detección de cáncer colorrectal <i>De 45 - 75 años, hable con su proveedor de atención médica.</i>				●	●	●	●	Hable con su proveedor de atención médica
Examen dental de cáncer oral		●	●	●	●	●	●	●
Vacunación contra la hepatitis B <i>Hasta los 60 años si no ha sido vacunado anteriormente. Después de los 60 años, hable con su proveedor de atención médica.</i>		●	●	●	●	●	Hable con su proveedor de atención médica	Hable con su proveedor de atención médica
Prueba de detección de la hepatitis C <i>Por lo menos una vez entre los 18 y los 79 años.</i>		●	●	●	●	●	●	
Vacunación contra el VPH <i>Hasta los 26 años si no ha sido vacunado.</i>		●						
Prueba de detección de cáncer de pulmón <i>Si es un fumador activo o un exfumador que consumió un paquete de tabaco al día durante al menos 20 años. Hable con su proveedor de atención médica, después de los 80 años.</i>					●	●	●	●
Prueba de detección de cáncer de próstata <i>Toma de decisión compartida a partir de los 50 años. Si es negro o si un familiar cercano fue diagnosticado antes de los 65 años, empiece a los 45. Si más de un familiar cercano ha tenido cáncer de próstata, empiece a hablar a los 40 años.</i>				●	●	●	●	●
Chequeos de la piel		●	●	●	●	●	●	●
Chequeos de los testículos		●	●	●	●	●	●	●

Para obtener información más detallada, visite
preventcancer.org/screening

Última revisión marzo 2024

