

# Detecção precoce = Melhores resultados

A triagem de rotina do câncer é capaz de detectar o câncer logo no início (mesmo se você não tiver sinais ou sintomas!) e aumenta a probabilidade do seu tratamento ser bem-sucedido.

Informe ao seu médico se houver qualquer histórico pessoal ou familiar de câncer, para determinar se você deve passar por alguma forma de triagem mesmo que for mais jovem ou se deve fazer exames com maior frequência. O histórico de determinados tipos de câncer na família, incluindo câncer de mama, colorretal e de próstata, pode deixar você em uma posição de maior risco de desenvolver um câncer.

Verifique as triagens abaixo, conforme a sua faixa etária		20s	30s	40s	50s	60s	70s	80s
Triagem e exames de câncer de mama <small>Se você for transgênero, informe o profissional de saúde.</small>	Exame clínico das mamas	●	●	●	●	●	●	●
	Mamografia			●	●	●	●	●
Triagem de câncer cervical <small>Idade de 21 a 65. Pacientes com mais de 65 anos, falar com um profissional de saúde..</small>		●	●	●	●	●	Fale com o profissional responsável	Fale com o profissional responsável
Triagem de câncer colorretal <small>Idade de 45 a 75. Pacientes com mais de 75 anos, falar com um profissional de saúde</small>				●	●	●	●	Fale com o profissional responsável
Exames de câncer de boca e odontológico		●	●	●	●	●	●	●
Vacinação contra hepatite tipo B <small>Até os 60 anos, se não tiver sido vacinado anteriormente. Pacientes com mais de 60 anos, falar com um profissional de saúde.</small>		●	●	●	●	●	Fale com o profissional responsável	Fale com o profissional responsável
Exames de hepatite tipo C <small>Pelo menos uma vez entre os 18 e os 79 anos.</small>		●	●	●	●	●	●	
Vacinação de HPV <small>Até os 26 anos, se não tiver sido vacinado anteriormente.</small>		●						
Triagem de câncer no pulmão <small>Fumante ativo ou ex-fumante que tenha fumado mais de um maço de cigarros por dia por pelo menos 20 anos. Pacientes com mais de 80 anos, falar com um profissional de saúde.</small>					●	●	●	●
Triagem de câncer de próstata <small>Processo decisório compartilhado a partir dos 50 anos. Se o paciente for negro ou se tiver um parente próximo que tenha sido diagnosticado antes dos 65 anos, os exames devem se iniciar aos 45 anos. Se tiver mais de um parente próximo diagnosticado, os exames devem se iniciar aos 40 anos.</small>				●	●	●	●	●
Exames de pele		●	●	●	●	●	●	●
Exames nos testículos		●	●	●	●	●	●	●

Para obter informações mais detalhadas, visite  
[preventcancer.org/screening](https://preventcancer.org/screening)

Última revisão em março de 2024